

Et liv uden styrende rusmidler

novavi

Hvilke bivirkninger har Campral?

Campral kan, som al anden medicin, have bivirkninger. Det er ikke alle der oplever bivirkninger, og bivirkningerne er ofte milde og forbigående. De mest almindelige bivirkninger er mavesmerter, kvalme, opkastning, kløe, manglende evne og lyst til sex.

Hvor længe skal jeg tage Campral?

Det er almindeligt, at behandlingen med Campral varer 1 år. De mest almindelige Lægen forbindelse, spørger lægen til patientens navn og CPR nummer

Novavi

Peter Bangs Vej 7A
2000 Frederiksberg

Telefon 39 45 54 55
novavi@novavi.dk



Campral

novavi.dk



Campral kan nedsætte trangen til alkohol, og dermed mindske risikoen for tilbagefald. Behandlingen med Campral skal altid kombineres med rådgivnings- eller behandlingssamtaler.

Campral virker ikke trangsnedsettende med det samme – du skal tage Campral i ca. 7 dage før der kan være en trangsnedsettende virkning. Du får den første pakke Campral hos Novavi. Hvis du oplever, at Campral nedsætter din trang til alkohol, vil lægen skrive en recept, så du fremover kan hente Campral på apoteket



Behandling med Campral

Hvor mange tabletter Campral skal jeg have?

Hvis du vejer mere end 60 kg skal du tage 2 tabletter Campral morgen, middag og aften – altså 6 tabletter om dagen. Vejer du mindre end 60 kg skal du tage det antal tabletter, som lægen anviser.

Hvordan skal jeg tage Campral?

Når du tager Campral, skal du synke tabletterne hele med rigeligt væske. Du må ikke knuse eller tygge tabletterne.

Hvad sker der, hvis jeg glemmer at tage Campral?

Du må ikke tage dobbeltdosis, hvis du glemmer at tage Campral. Så springer du den glemte dosis over.

Det skal du vide

- Kan jeg tåle Campral?
- Du skal fortælle lægen hvis du:
- Har nedsat nyrefunktion
- Har meget nedsat leverfunktion
- Hvis du er gravid
- Hvis du ammer
- Hvis du er under 18 år
- Hvis du er over 65 år